

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ЦИНАРІКС ФОРТЕ**  
**(CYNARIX FORTE)**

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить екстракту листя артишоку сухого (*Cynara scolymus L., folium*) (4–6:1) (екстрагент: вода) – 600 мг;  
*допоміжні речовини:* мальтодекстрин, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, магнію стеарат;  
оболонка: акація (гуміарабік), сахароза, тальк, титану діоксид (E 171), еудрагіт E12.5 (розчин сухої субстанції куркуміну 12,5 % (E 100) у суміші із 60 % ізопропіловим спиртом і 40 % ацетоном), метилцелюлоза, кальцію карбонат (E 170), повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, гліцерин 85 %, монтангліколевий віск.

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті оболонкою.

**Основні фізико-хімічні властивості:** двоопуклі, продовгуваті, блискучі, гладкі, білі таблетки вкриті оболонкою.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код АТХ А05А Х

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Фармакологічні властивості обумовлені дією комплексу біологічно активних речовин, що входять до складу листя артишоку польового, а саме: кофеїлхінічних кислот (CQA), флавоноїдів (наприклад, лютеолін) і сесквітерпенових лактонів. CQA підвищують жовчовиділення. Гіполіпідемічний ефект є властивим лютеоліну, який інгібує біосинтез холестерину. Гіркі сесквітерпенові лактони (наприклад, цинаропікрин) стимулюють виділення шлункової кислоти. *In vitro* CQA продемонстрували захисні властивості щодо гепатоцитів.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Хронічний гепатит, цироз печінки, хронічний некалькульозний холецистит, дискінезія жовчних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічний нефрит, хронічна ниркова недостатність.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу та до рослин родини *Asteraceae* (складноцвітих); непрохідність жовчних шляхів, холангіт, нагноєння (емпієма) жовчного міхура, жовчнокам'яна хвороба чи інші захворювання жовчних шляхів, гострі захворювання печінки, тяжка печінкова недостатність; непрохідність сечовивідних шляхів, гострі захворювання нирок.

**Особливі заходи безпеки.**

Застосовувати з обережністю при захворюваннях, що можуть призвести до непрохідності жовчних шляхів, та при тяжких захворюваннях печінки. У разі виникнення діареї або болю в животі лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.

Лікарський засіб містить сахарозу. Тому пацієнти з непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози або недостатністю цукрази-ізомальтази не повинні застосовувати препарат.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Жодних повідомлень про взаємодію препарату «Цинарікс форте» з іншими лікарськими засобами не надходило.

**Особливості застосування.**

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Через відсутність достатніх даних прийом в період вагітності і годування груддю не рекомендується.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

«Цинарікс форте» не впливає на здатність керувати транспортними засобами і механізмами.

**Спосіб застосування та дози.**

**Дози**

*Дорослі та діти від 12 років:*

по 1 таблетці, вкритій оболонкою, двічі на день.

#### Спосіб застосування

Препарат необхідно приймати під час їди, запиваючи достатньою кількістю води (наприклад, 1 склянкою). Курс лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 2–3 тижні. Проведення повторних курсів лікування можливе після погодження з лікарем.

#### Діти.

Не рекомендується приймати дітям до 12 років через відсутність достатніх даних щодо прийому.

#### ***Передозування.***

Можливе посилення побічних ефектів.

#### ***Побічні реакції.***

Можлива помірна діарея з коліками в животі, а також епігастральні розлади, наприклад нудота або печія, алергічні реакції, включаючи кропив'янку, шкірні висипи, гіперемію та свербіж. У разі появи небажаних реакцій слід проконсультуватися із лікарем.

#### ***Термін придатності.***

3 роки.

#### ***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла.

#### ***Упаковка.***

По 15 таблеток в блістері, по 30 таблеток (15×2) або 90 таблеток (15×6) в картонній упаковці.

#### ***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

#### ***Виробник.***

Фармацеутише фабрік Монтавіт ГмбХ

#### ***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.***

Зальбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрія

#### ***Дата останнього перегляду.***